

Félicitations! Vous venez de terminer votre traitement d'agents de comblement.

- **Éviter de masser ou de manipuler** la zone traitée durant les 24 premières heures.
- Prévoir une **faible exposition au soleil** et aux rayons UV durant les 2 semaines suivant l'injection.
- **Éviter l'exercice intense** pour les 24 heures suivant vos traitements.
- Les ecchymoses (bleus) sont rares, mais quelques fois inévitables malgré les plus grandes précautions. Importunes, mais non dangereuses, elles peuvent facilement être cachées avec un camouflant et disparaîtront après 5 à 10 jours. Une **crème d'ARNICA** (Traumacare®/Arnicare®) appliquée 3 fois/jour peut accélérer la guérison.
- Des réactions inflammatoires telles une rougeur, une douleur légère à la pression ou de l'enflure peuvent survenir aux sites d'injection. Ces réactions peuvent persister jusqu'à 7 jours suivant l'injection.
- En cas d'enflure, vous pouvez appliquer au besoin des **compresses froides** pour une durée de 10 à 15 minutes et ce, à toutes les 30 à 60 minutes (ne pas appliquer de glace directement sur le visage).
- Bien qu'invisible à l'œil, il est tout à fait normal de sentir au toucher la présence du produit sous la peau, puisque ce dernier prend de quelques jours à quelques semaines pour bien se mouler au visage.
- Une aggravation/persistance des douleurs ou l'apparition d'une décoloration blanchâtre/bleutée de la peau doit **immédiatement être signalée** en téléphonant au numéro ci-bas.