

RECOMMANDATIONS APRÈS VOTRE TRAITEMENT

Félicitations, vous avez terminé votre séance de traitement du double menton par l'acide désoxycholique (Belkyra®)! Voici nos recommandations à suivre pour la prochaine semaine. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec nous immédiatement. Nous sommes là pour vous aider.

- Ne vous inquiétez pas si les régions traitées sont légèrement sensibles ou enflées. Ces symptômes disparaîtront par eux-mêmes dans les prochains jours.
- **Éviter de masser ou de manipuler** la zone traitée durant les 24 premières heures.
- Vous pouvez appliquer au besoin des **compresses froides** pour une durée de 10 à 15 minutes et ce, à toutes les 30 à 60 minutes (ne pas appliquer de glace directement sur la peau).
- L'application d'une **crème à base d'Arnica** (Traumacare®/Arnicare®) appliquée 3 fois/jour peut accélérer la guérison, en diminuant les ecchymoses et l'enflure pouvant parfois survenir après les traitement.
- L'apparition d'un sourire asymétrique ou de faiblesses musculaires, d'ulcères cutanés au niveau de la région injectée ou encore de difficulté à avaler doit **immédiatement être signalée** en téléphonant au numéro ci-bas.

www.clinicare.ca

  [clinicare.md](https://www.instagram.com/clinicare.md)