

RECOMMANDATIONS AVANT VOTRE TRAITEMENT

Nous avons hâte de vous voir pour votre traitement! D'ici-là, suivez ces recommandations pour optimiser vos résultats.

- Éviter si possible la prise d'alcool, d'anti-inflammatoires (Advil®, Motrin®, Celebrex®, Naproxen®, etc.), d'Oméga-3 ainsi que de multi-vitamines dans les 7 jours précédant vos traitements, car ceux-ci augmentent le risque d'ecchymoses (bleus).
- En cas d'infection en cours ou de prises d'antibiotiques, veuillez reporter votre rendez-vous.
- Pour plus de confort lors des traitements, vous pourriez prendre 2 comprimés d'acétaminophène (Tylenol®) 500 mg une heure avant votre rendez-vous.
- Nous vous recommandons de suspendre l'application de crèmes à base de Retin-A trois jours avant votre traitement, car celles-ci pourrait augmenter l'apparition de rougeurs et d'irritation suite au traitement de Belkyra®.
- Prévoir le bon moment pour effectuer vos traitements, car il pourrait y avoir des rougeurs, une légère enflure et, plus rarement, des ecchymoses suite à vos traitements d'injectables.

www.clinicare.ca

  [clinicare.md](https://www.instagram.com/clinicare.md)